


Phòng trừ bệnh vàng lá thối rễ trên cây có múi với bộ đôi TB FOSKASA + TB SẠCH NẤM KHUẨN

Mưa kéo dài làm cho khả năng sinh trưởng và phát triển của các loại cây ăn quả bị ảnh hưởng, trong đó cây có múi sẽ bị ảnh hưởng nhiều đặc biệt do bệnh vàng lá thối rễ gây hại.

1. Nguyên nhân

Bệnh vàng lá thối rễ xuất hiện từ sự hư hại của bộ rễ bởi các tác nhân vi sinh vật đất (nguyên nhân trực tiếp) và kỹ thuật canh tác (nguyên nhân gián tiếp), dẫn đến các nguồn nước, dinh dưỡng từ đất không được vận chuyển lên cây đầy đủ và kịp thời làm cây sinh trưởng và phát triển còi cọc, suy yếu dần rồi chết đi.



- Nguyên nhân gián tiếp: Là các nguyên nhân làm suy yếu hệ miễn dịch của bộ rễ, tạo vết thương ở bộ rễ, hoặc rễ bị hư thối tạo tiền đề cho sự phát sinh của vi nấm và tuyến trùng gây hại:

+ Vườn cây lên líp, lên mô thấp, thoát nước kém và thường xuyên bị ngập úng, hoặc trong quá trình xiết nước xử lý ra hoa vào mùa nắng làm cho rễ suy yếu (do thiếu nước), một số rễ khỏe ăn sâu xuống khi mùa mưa tới thì thoát nước không kịp, làm cho rễ bị ngập nước, rễ thiếu oxy, dẫn đến đầu chóp rễ và lông hút bị hư thối.

+ Vườn ít sử dụng phân hữu cơ và lạm dụng phân bón hóa học quá mức, đặc biệt sử dụng nhiều phân bón có chứa các chất kích thích sinh trưởng như NAA, IAA, 2,4-D... ở liều quá mức đã làm cho bộ rễ nhanh lão hóa và phá vỡ cấu trúc đất, làm cho các vi sinh vật đối kháng có ích trong đất bị tiêu diệt, các vi sinh vật có hại phát sinh mạnh.

- Nguyên nhân trực tiếp: Các nghiên cứu về tác nhân vi sinh vật trực tiếp gây [bệnh vàng lá thối rễ trên cây có múi](#) chỉ ra rằng nấm Fusarium solani, Phytophthora spp, Rhizoctonia Solani và tuyến trùng là các đối tượng chính gây nên bệnh này.

2. Điều kiện phát sinh và gây hại

Bệnh thường phát sinh trong mùa mưa lũ hoặc sau khi tưới nước ra hoa và phát triển thành dịch vào đầu mùa nắng.

3. Triệu chứng

- Trên cành lá:

+ Cây bị nhẹ (mới chớm bệnh), kích thước lá vẫn bình thường, gân lá chuyển vàng nhạt, phiến lá chuyển màu vàng cam. Cây bị nhẹ chỉ có một số cành biểu hiện vàng lá, rụng lá.

+ Cây bị nặng, kích thước lá nhỏ hơn bình thường, gân lá có màu vàng trắng, phiến lá màu vàng và sau đó rụng đi. Cây cho nhiều chồi ngắn, lá nhỏ, nhiều hoa nhỏ, trái nhỏ và chua. Khi bị nặng thì toàn cây đều vàng và rụng lá. Các lá già phía dưới rụng trước rồi đến các lá trên.

- Dưới rễ:

Ở phía cành có lá bị vàng rụng thì rễ bị thối, vỏ rễ tuột khỏi phần gỗ, gỗ bị sọc nâu lan dần vào rễ lớn. Bệnh nặng tất cả các rễ đều bị thối và cây chết.

4. Biện pháp phòng trị

Bệnh Vàng lá thối rễ trên cây có múi phát sinh và phát triển gây hại từ nhiều nguyên nhân, cho nên để hạn chế bệnh cần có chế độ canh tác bền vững và phòng trị kịp thời ngay từ đầu.

- Khi trồng mới nên trồng nơi đất cao, thoát nước tốt, đặc biệt trong mùa mưa.

- Bón vôi vào đầu mùa mưa để sát khuẩn, ngăn ngừa nấm bệnh và nâng pH đất giúp cây sinh trưởng phát triển tốt.

- Tăng cường sử dụng cân đối phân hữu cơ, phân bón hữu cơ khoáng với phân hóa học để ổn định cấu trúc đất, tăng độ mùn, tơi xốp cho đất, tạo điều kiện cho các vi sinh vật có ích phát triển và tránh làm tổn thương bộ rễ.

5. Giải pháp TB FOSKASA + TB SẠCH NẤM KHUẨN phòng trị [bệnh vàng lá thối rễ trên cây có múi](#)

Phòng trừ bệnh vàng lá thối rễ trên cây có múi với bộ đôi TB FOSKASA + TB SẠCH NẤM KHUẨN



Phân bón lá - TB FOSKASA

Quy cách: chai 500ml, can 5 lít, phuy 20 lít.

THÀNH PHẦN:

Zinc Sulfate 75g/l

Magie sulfate ... 50g/kg

Naa 200ppm

Cytokinin 800ppm

ĐẶC TÍNH & CÔNG DỤNG:

-

Cung cấp dinh dưỡng cân đối thiết yếu cho cây trồng. Giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.

-

Phát triển hệ rễ thúc đẩy quá trình đẻ nhánh chống nghẹn rễ do ảnh hưởng của phèn. Giúp hệ lá phát triển.

-

Tăng khả năng quang hợp và khả năng hấp thụ phân bón tốt.

-

Hạn chế và hồi phục cây bị vàng lá.

-

Tăng tính chống chịu cho cây đối với sâu bệnh, hạn hán và ngập úng.

-

Tăng năng suất và phẩm chất đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	LIỀU LƯỢNG (ml/ bình 16 lít)	CHU KÌ SỬ DỤNG
Cây công nghiệp: Điều, Cà Phê, Ca Cao, Cao Su, Thuốc Lá, Bông Vải, Chè, ...	40-50ml	15-20 ngày/ 1 lần.
Cây ăn trái: Cam, Chanh, Quýt, Bưởi, Sơ Ri, Xoài, Nhãn, Sầu Riêng, Thanh Long, Mãng Cầu, Vú Sữa, Mít, Ổi, Nho, Mãng Cụt, Dừa, Táo, ...	Cây chưa có trái: 40 50ml	Cây chưa có trái: 10-15 ngày 1 lần.
	Cây đã có trái: 20-25ml	Cây đã có trái: 15-20 ngày/ lần.
Rau củ: Khoai Lang, Khoai Tây, Củ Cải, Khoai Môn, Cà Rốt, Củ Sắn, Ớt, Đậu Cô Ve, Đậu Đũa, Đậu Bắp, Bầu , Xà Lách, Bắp Cải, Xà Lách Xoang, Đu Đủ, Dưa Leo, Khổ Qua, Cà Chua, Bí, Dâu Tây, Rau gia vị các loại, ...	Thời kì non: 20-25ml	Thời kì non: 7-10 ngày/lần.
	Thời kì lớn: 40-45ml	Thời kì lớn: 10-15 ngày/lần.
Cây lương thực: Lúa, Bắp, Mè, Đậu Xanh, Đậu Nành, Đậu Đỏ, Đậu Phộng, Đậu Hà Lan, ...	20-25ml	10-20 ngày 1 lần.
Hoa kiểng: Hoa Phong Lan các loại, Hoa Hồng, Hoa Cúc, Hoa Huệ, Hoa Lay Ơn, Hoa Ly, Bon Sai các loại, ...	20-25ml	Cây nhỏ: 10-15 ngày/lần

Cây trồng thành:

10-20 ngày/lần

Chai 500ml pha được 1 phuy 220 lít nước.

TB sạch nấm khuẩn

Quy cách: gói 35g, 250g, 400g

THÀNH PHẦN:

Bismerthiazol 200g/kg

Streptomycin Sulfate 50g/kg

ĐẶC TÍNH & CÔNG DỤNG:

- Hoạt chất: **Bismerthiazol** và **Streptomycin Sulfate** trong danh mục thuốc BVTV đã được một số tổ chức trong và ngoài nước đăng ký ở Việt Nam để trừ bệnh như: **Đạo ôn, bạc lá, vàng lá lúa; Phấn trắng hại nho; Thối vi khuẩn hại rau; Đốm lá, sương mai dưa chuột; Thán thư dưa hấu, chết nhanh dưa hấu; Vi khuẩn bông xoài; Thối nhũn bắp cải; Sẹo hại cây có múi; Héo rũ (chết ẻo) cây con hại rau.**

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG	BỆNH HẠI	CÁCH PHA
Lúa	Vàng lá, bạc lá, lép đen, lép vàng trên lúa.	Pha 35g cho bình 20 lít, phun 2 bình cho 1.000m ² .
Rau màu	Thối nhũn vi khuẩn, thán thư.	Hoặc pha 250g cho 1 phuy 200 lít, phun 2 phuy cho 10.000m ² (hecta).
Cam, Quýt	Loét, sẹo.	
Mít	Sơ đen múi mít.	
Tiêu	Vàng lá, khảm lá.	
Cà phê	Thán thư, khô quả.	

Hoa, Cây cảnh Đốm đen, phấn trắng, thối gốc.

- Thời điểm phun: Phun khi bệnh chớm phát hiện trên lá, phun khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10%. Nếu bệnh nặng phun lần 2 sau 5 - 7 ngày.

Thời gian cách ly: 05 ngày sau khi phun thuốc.

Thông tin liên quan



—

BỘ TRÍ GÂY HẠI SÂU RIÊNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ



THIBIDES®
Đồng hành cùng phát triển

NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA

- ✓ Bệnh cháy lá
- ✓ Bệnh thán thư
- ✓ Bệnh nứt thân xì mũ
- ✓ Bệnh thối trái



LIÊN HỆ NGAY

Email: info@bvtvthienbinh.com

Hotline: **0898.999.929**

[NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA](#)

THIBIDES
Đồng hành cùng phát triển

Bọ trĩ **Muỗi hành**

Rầy nâu **Sâu đục thân**

ĐẶC TRỊ!

Rầy phấn trắng

LIÊN HỆ NGAY Email: bvtvthienbinh@gmail.com Hotline: **0898.999.929**

THIBIDES
Hàng hiệu KINH DOANH
TB DIETRAY
NEW
Hoạt chất: Dimethofuran - 25% n.v.
1st NUMBER
**THÂM SÂU LƯU DẦN,
CHUYÊN VI MẠNH,
DIỆT CÁC LOẠI CÔN TRÙNG,
KHÔ TỠ DÃ KHANG THUỘC**
Mỗi thùng 120g
Sản phẩm của: **CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH**
Địa chỉ: K22-02, KDC SỔ VHTT, D.Lân Phường 9, Phú Hiệp, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: 0932 46 12 82 - Hotline: 0898 999 929
Email: bvtvthienbinh@gmail.com - Website: www.thienbinh.vn

BÍ QUYẾT GIÚP NÔNG DÂN PHÒNG TRỪ CÁC LOẠI SÂU HẠI LÚA



THIBIPES
Đồng hành cùng phát triển

3 LOẠI BỆNH
PHỔ BIẾN
THƯỜNG GẶP
TRÊN ỚT CHUÔNG

Liên hệ ngay

Website
<https://bvtvthienbinh.com>

Hotline
0898.999.929

BỆNH PHỔ BIẾN TRÊN CÂY ỚT CHUÔNG VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ