

## Rụng quả non trên cây ăn trái và thuốc trị rụng quả non trên cây ăn trái

Hiện tượng rụng quả non ở các cây ăn quả như sầu riêng, xoài, mít, cam, quýt, chanh và nhiều loại cây khác là một hiện tượng tự nhiên, bình thường. Ở một số cây như xoài, nhãn... tỉ lệ quả non bị rụng phổ biến tới trên 90%. Tuy vậy nếu bị rụng nhiều quá sẽ làm giảm năng suất và cần phải có biện pháp hạn chế.

Rụng quả do 3 nguyên nhân chủ yếu như thiếu dinh dưỡng, thời tiết không thích hợp hoặc thay đổi đột ngột và do sâu bệnh hại. Về cơ chế thì sự rụng quả là do một số tế bào ở cuống quả bị chết tạo thành một tầng rời.



### 1. Nguyên nhân do thiếu dinh dưỡng:

Sau khi đậu quả, cây thiếu dinh dưỡng sẽ không đủ sức nuôi toàn bộ số quả trên cây nên phải rụng bớt đi để tập trung dinh dưỡng nuôi số quả còn lại. Khắc phục nguyên nhân này bằng cách bón phân cung cấp bổ sung dinh dưỡng cho cây.



#### **- Cách bón:**

Bón phân đầy đủ, cân đối giữa phân hữu cơ, đạm và lân sau mỗi vụ thu hoạch để cây lấy lại sức phát triển thân lá, đủ khả năng nuôi được nhiều quả về sau. Lượng phân nên bón theo sản lượng quả mà cây đã đạt được hoặc dự kiến sản lượng cây sẽ cho thu hoạch;

Khi quả non đã hình thành cần nhiều đạm và kali: Bón hỗn hợp phân Đạm Urê và phân Kaly clorua (Kaly đỏ) để cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây, lượng phân bón tùy thuộc vào tuổi cây và sản lượng quả cho thu hoạch;

Ngoài phân bón gốc, ở giai đoạn cây đã có quả non sử dụng phân bón qua lá có hàm lượng đạm, kali và các nguyên tố vi lượng đem lại hiệu quả nhanh và rõ rệt.

## **2. Nguyên nhân do thời tiết**

Diễn biến thời tiết như khô hạn kéo dài, giá lạnh, thời tiết thay đổi đột ngột hoặc mưa gió lớn làm tăng tỷ lệ rụng quả, nguyên nhân này biện pháp hạn chế khó khăn, bà con nên áp dụng theo kinh nghiệm thực tế ở từng địa phương.

## **3. Nguyên nhân do sâu bệnh hại**

Giai đoạn từ khi có quả non đến thu hoạch cần chú ý một số sâu bệnh hại chính: Nhện đỏ, bệnh Phấn trắng, bệnh Loét và Bệnh nứt thân sùi bọt...

Nhện đỏ, bệnh loét làm lá và quả non bị vàng và rụng.



Bệnh nứt thân sùi bọt, phần trắng làm cả cây bị suy yếu, gây rụng lá và rụng quả non hàng loạt, bệnh nặng có thể làm chết cây, cần phát hiện và phòng trừ sớm.

Những cây nhiễm bệnh vàng lá gân xanh (Greening) tỉ lệ quả non bị rụng cũng rất cao.

Nguyên tắc chung phòng trừ sâu bệnh cho các cây có múi cũng phải áp dụng bằng việc thực hiện tổng hợp hài hòa các biện pháp (IPM): từ chọn giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc, bón phân, tia cảnh, tạo tán, bắt sâu, ngắt lá bệnh, bẫy bả, bảo vệ con có ích...chỉ phun thuốc Bảo vệ thực vật khi thật cần thiết.

#### 4. Thuốc trị rụng trái non cây ăn trái hiệu quả nhất hiện nay

### CANXI-BO-GA<sub>3</sub>



**Quy cách:** chai 500ml

#### **THÀNH PHẦN:**

CaO: 15% ; B: 10.9% ; GA<sub>3</sub>: 5000ppm ; Mg: 0.8% ; S: 0.5% ; Cu: 2200ppm ; Zn: 1200ppm

#### **ƯU ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM:**

- Dưỡng hoa, giúp hoa trội nhanh, mạnh, hoa khỏe, nụ trứng cá xanh mạnh, không bị lì hột, tăng thụ phấn đậu trái. Hạn chế hiện tượng trái non dạng móc câu.

#### **ĐẶC TÍNH & CÔNG DỤNG:**

- Dưỡng hoa, hoa to khỏe, chống rụng hoa, rụng nụ, tăng thụ phấn, đậu trái tối đa.
- Giúp bông sáng, nụ hoa trứng cá mau trội, hột xanh, mạnh, khắc phục hiện tượng nụ hoa trứng cá

bị vàng, yếu, lì hột.

- Tăng khả năng chống chịu của hoa đối với thời tiết bất lợi như: chống khô đen bông, chống sương muối, hoa không bị hại khi trời mưa, chống héo trái non, phòng trừ hiện tượng trái non dạng móc câu.
- Tăng hiệu quả sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

#### **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:**

| <b>GIAI ĐOẠN</b>               | <b>LIỀU DÙNG</b> | <b>LƯỢNG NƯỚC</b> |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| Khi tước bông xuất hiện        | 15-20ml          | 8-10 lít          |
|                                | 1 chai           | 2 phuy (440 lít)  |
| Khi tước bông dài 6 - 8 cm     | 10-15ml          | 8-10 lít          |
|                                | 1 chai           | 2 phuy (440 lít)  |
| Trước và sau khi nở hoa 5 ngày | 10ml             | 8-10 lít          |
|                                | 1 chai           | 2 phuy (440 lít)  |

Mỗi đợt nên sử dụng 2 lần, cách nhau 5 - 7 ngày.

**AMICOL 360EC**



**Quy cách:** chai 240ml

**THÀNH PHẦN:**

Difenoconazole ... 155g/l

Propiconazole ..... 155g/l

Tebuconazole ..... 50g/l

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:**

**CÂY TRỒNG**

**DỊCH HẠI**

**LIỀU LƯỢNG**

Lúa

Lem lép hạt.

Pha 20ml/ bình 25 lít.

Đốm vằn.

Chuối

Thán thư, tạo phấn trái.

Pha 10-12ml/ bình 20 lít.

Chai 240ml pha cho 2 phuy 200 lít.

Mít

Sơ đen múi mít, thối quả.

Liều lượng: 0,3-0,5 lít/ ha. Lượng nước  
400-500 lít/ ha.

Cây ăn trái: Sầu Riêng, Xoài,  
Mãng Cầu.

Thán thư, khô đen bông,  
bóng đẹp trái.

Thời gian cách ly: 07 ngày.

Rau màu: Ớt, Cà Chua, Bắp Cải, Thán thư (đốm mắt cua).  
Dâu Tây, Hoa Hồng, ...

## Amtivo 750WG



**Quy cách:** gói 14g

### THÀNH PHẦN:

Tebuconazole .... 500g/kg

Trifloxystrobin ... 250g/kg

Phụ gia ..... 250g/kg

## ĐẶC TÍNH & CÔNG DỤNG:

- Là thuốc trừ bệnh phổ rộng công nghệ mới, nội hấp, lưu dẫn, trừ được nhiều loại bệnh xuất hiện cùng một lúc, ức chế quá trình sinh tổng hợp của các tế bào nấm bệnh. Thuốc đăng ký đặc trị hiệu quả bệnh đốm lá trên hồ tiêu.
- Được sản xuất bởi nhà máy tốt nhất trên thế giới về thuốc trừ bệnh. Với liều lượng tăng hơn 40% so với loại thông thường. Đã tốt nay còn tốt hơn; yên tâm tuyệt đối khỏi lo bệnh đạo ôn cổ bông, đạo ôn lá, đạo ôn cổ lá.
- Đặc trị: **đạo ôn, lem lép hạt, vàng lá chín sớm (do nấm), khô vằn trên lúa.**

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

| CÂY TRỒNG                                                                               | BỆNH HẠI                                                        | LIỀU LƯỢNG                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Lúa                                                                                     | Đạo ôn, lem lép hạt, vàng lá chín sớm (do nấm), khô vằn .       | 14g/ bình 25 lít. Phun 2 bình cho 1.000m <sup>2</sup> . |
| Rau màu: Cà Chua, Ổt, Dưa Hấu, Bắp Cải, Hoa Cúc, Dâu Tây, Cây họ đậu, ...               | Rỉ sắt, thán thư, đốm lá, phấn trắng, đốm vòng, ...             | 40g/ 100 lít nước, phun ướt đều tán lá cây.             |
| Cây ăn quả: Xoài, Thanh Long, Sầu Riêng, Bưởi, Nho, Đìêu, Cam, Quýt, Vải, Mãng Cầu, ... | Thán thư, cháy lá, đốm đen quả, rỉ sắt, đốm vòng, thối quả, ... | 80g/ 1 phuy 200 lít.<br>Phun ướt đều tán lá cây.        |

- Thời gian cách ly an toàn: 07 ngày trước khi thu hoạch.

*Nguồn BVTV Thiên Bình tổng hợp*

## CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH.

ĐC: E22-D2, KDC SỞ VH TT, ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG, P. PHÚ HỮU, TP. THỦ ĐỨC, TP.HCM.

ĐT: 02822.48.52.52

Email: bvtvthienbinh@gmail.com

Web: www.bvtvthienbinh.com

Link Fanpage: <https://www.facebook.com/THIEN-BINH-102656208736169>

## Thông tin liên quan



[BỘ TRÍ GÂY HẠI SÂU RIÊNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ](#)

An infographic with a background of durian leaves and a large durian fruit. At the top left is the THIBIDES logo with the tagline 'Đồng hành cùng phát triển'. The main title is 'NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA'. Below the title is a list of four diseases, each with a green checkmark icon: 'Bệnh cháy lá', 'Bệnh thán thư', 'Bệnh nứt thân xì mù', and 'Bệnh thối trái'. To the right of the list are four circular images showing the symptoms of these diseases: a leaf with a hole, a stem with a large hole, a leaf with a tear, and a durian fruit with a dark spot. At the bottom right is a cartoon white rooster with a red comb. At the bottom left is a green button that says 'LIÊN HỆ NGAY'. At the bottom center are the email 'info@bvtvthienbinh.com' and the hotline '0898.999.929' with a phone icon.

**THIBIDES**  
Đồng hành cùng phát triển

## NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA

- ✓ Bệnh cháy lá
- ✓ Bệnh thán thư
- ✓ Bệnh nứt thân xì mù
- ✓ Bệnh thối trái

**LIÊN HỆ NGAY**

Email: [info@bvtvthienbinh.com](mailto:info@bvtvthienbinh.com)

Hotline: 0898.999.929

[NHỮNG BỆNH HẠI ĐÁNG LO NGẠI TRÊN SẦU RIÊNG VÀO MÙA MƯA](#)

**THIBIDES**  
Đồng hành cùng phát triển

**Bọ trĩ** **Muỗi hành**

**Rầy nâu** **Sâu đục thân**

**ĐẶC TRỊ!**

**Rầy phấn trắng**

**LIÊN HỆ NGAY** Email: [bvtvthienbinh@gmail.com](mailto:bvtvthienbinh@gmail.com) Hotline: **0898.999.929**

**TB DIETRAY NEW**  
Hoạt chất: Dimethofuran - 25% w/v

**THAM SÂU LỪ ĐÀN, CHUYÊN VỊ MẠNH, DIỆT CÁC LOẠI CÔN TRÙNG, KHÔ TRỊ ĐÃ KHANG THUỘC**

Sản phẩm của: **CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV THIÊN BÌNH**  
Địa chỉ: K22-02, KDC SỔ VHTT, D.Lân Phường 9, Phú Hiệp, TP. Thủ Đức, TP. HCM  
Điện thoại: 0932 46 12 82 - Hotline: 0898 999 929  
Email: [bvtvthienbinh@gmail.com](mailto:bvtvthienbinh@gmail.com) - Website: [www.thienbinh.vn](http://www.thienbinh.vn)

**BÍ QUYẾT GIÚP NÔNG DÂN PHÒNG TRỪ CÁC LOẠI SÂU HẠI LÚA**

THIBIPES

Đồng hành cùng phát triển

**3** LOẠI BỆNH  
PHỔ BIẾN  
THƯỜNG GẶP

**TRÊN ỚT CHUÔNG**

Liên hệ ngay



Website

<https://bvtvthienbinh.com>



Hotline

**0898.999.929**

[BỆNH PHỔ BIẾN TRÊN CÂY ỚT CHUÔNG VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ](#)